

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسئلة المتداولة بشأن لقاح الأطفال

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على لقاح فايزر/بيونتك لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأي شخص يبلغ من العمر 5 أعوام أو أكبر. لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مجانية لأي شخص يعيش في الولايات المتحدة، حتى لو لم يكن لديك تأمين صحي أو لم تكن مواطناً أمريكياً. لقاح فايزر هو لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الوحيد المعتمد للأطفال في الوقت الحالي. لقاحات موديرنا وجونسون أند جونسون معتمدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليست فعالة فحسب في منع المرض ودخول المستشفى والوفاة، ولكنها ستساعدنا على العودة إلى أنشطتنا الطبيعية. تعمل اللقاحات ضد متحورات الفيروس الجديدة التي تم اكتشافها حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يقررون الحصول على اللقاح لا يحمون أنفسهم فقط من الفيروس، بل يساعدون أيضًا على حماية أولئك الذين يهتمون لأمرهم، مثل الأجداد والمعلمين والأشقاء الذين يعانون من نقص المناعة.

لماذا ينبغي للأطفال الحصول على اللقاح؟

يصاب الأطفال بالفيروس بمعدلات مماثلة للبالغين، بل يمرض بعض الأطفال لدرجة تستلزم العلاج في المستشفى. توفي أكثر من 600 طفل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الفيروس هو أحد أهم 10 أسباب لوفاة الأطفال في الولايات المتحدة.

الأعراض الجانبية الشديدة أو الخطرة.

التأق، أو رد الفعل التحسسي تجاه اللقاح نادر. تكاد هذه الأنواع من ردود الفعل التحسسية تحدث دائمًا في غضون 30 دقيقة من الحصول على اللقاح. قد يعاني الأطفال من صعوبة التنفس، أو تورم الوجه أو الحلق، أو طفح جلدي في الجسم، أو الدوار والضعف. لهذا السبب من المهم البقاء لمدة 15 إلى 30 دقيقة بعد الحصول على اللقاح، حتى يتمكن الفريق الطبي من التأكد من أن كل شيء على ما يرام. يجب ألا يحصل أي شخص على الجرعة الثانية من اللقاح إذا عانى من رد فعل تحسسي مفرط بعد الجرعة الأولى.



ماذا لو كان طفلي

قد أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟

يُوصي بأن يحصل طفلك على اللقاح حتى لو كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل. التطعيم باللقاح وسيلة أكثر أمانًا وفعالية لاكتساب المناعة من اكتسابها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كمرض. تشير التقديرات إلى أن 43% فقط من الأطفال في الولايات المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا يتمتعون بقدر معقول من المناعة الطبيعية.

هل هناك أعراض جانبية؟

من الطبيعي أن تشعر بأعراض جانبية، مثل الحمى أو التهاب الذراع، بعد الحصول على اللقاح. الأعراض الجانبية الشديدة نادرة. قد يشعر الأطفال بوعكة صحية لبضعة أيام بعد الحصول على اللقاح. ولا يعاني بعضهم من أي أعراض جانبية. قد تكون الأعراض الجانبية الشائعة هي القشعريرة أو الإسهال أو الحمى أو الصداع أو الغثيان أو الإجهاد.

السن والجرعات.

تختلف جرعات اللقاح للأطفال في عمر 5 إلى 11 عامًا عن جرعات البالغين والمراهقين. لقاح الأطفال سلسلة من جرعتين، يفصل بينهما 3 أسابيع. تعتمد الأهلية للحصول على اللقاح على عمر الطفل، وليس وزنه. إذا بلغ عمر طفلك 12 عامًا في الفترة بين حصوله على الجرعتين الأولى والثانية، فيجب أن يحصل على الجرعة المخصصة للأطفال في المرة الأولى ثم الجرعة المخصصة للبالغين في المرة الثانية.

من الذي ينبغي ألا يحصل على لقاح فايزر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟

- لقاح فايزر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) معتمد للأشخاص بعمر 5 أعوام أو أكبر. ينبغي ألا يحصل طفلك على اللقاح لو أنه:
 - كان قد عانى من رد فعل تحسسي شديد قبل ذلك أو بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.
 - كان قد عانى من رد فعل تحسسي شديد قبل ذلك حتى وإن لم يكن شديدًا تجاه أي من مكونات اللقاح. (الرنا المرسال، والدهون/المواد الدهنية، والسكر، وموازانات الأحماض)

يمكن أن يحصل طفلك على اللقاح حتى لو كان لديه تاريخ من ردود الفعل التحسسية التي لا تتعلق باللقاحات أو الأدوية عن طريق الحقن، مثل الطعام، أو الحيوانات الأليفة، أو السموم، أو الحساسية البيئية، أو اللاتكس (المطاط). ويمكنه أيضًا أن يحصل على اللقاح إذا كان لديه تاريخ من الحساسية تجاه الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو تاريخ عائلي من ردود الفعل التحسسية الشديدة.



ما هو التهاب عضلة القلب؟

التهاب عضلة القلب هو تورم والتهاب في عضلة القلب أو التأمور، التهاب الغشاء المحيط بالقلب بعد لقاحات الرنا المرسل (فايزر). وعادةً ما ترى هذا بعد الجرعة الثانية، ويحدث على الأرجح للذكور في عمر 12 إلى 17 عامًا. هذه حالة مرضية خطيرة، ولكن يمكن علاجها. ويستجيب معظم مرضى التهاب عضلة القلب أو التهاب التأمور بشكل جيد للدواء والراحة ويشعروا بالتحسن سريعًا. التهاب عضلة القلب نادر الحدوث جدًا بعد الحصول على اللقاح، حوالي 54 حالة من كل مليون جرعة. عادةً ما تظهر أعراض التهاب عضلة القلب في غضون 7 أيام من الحصول على اللقاح. ويمكن أن تتمثل الأعراض في صورة ألم في الصدر أو ضيق التنفس أو الإحساس بسرعة نبضات القلب أو خفقانه. لم يثبت وجود ارتباط بين وفيات التهاب عضلة القلب واللقاحات في الولايات المتحدة، ولكنه من الأعراض الجانبية التي ينبغي لك الانتباه لها لدى طفلك.

هل تسبب لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حدوث أي حالات وفاة؟

لم تحدث أي وفيات بسبب اللقاحات بشكل مباشر. من بين أكثر من 423 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم إعطاؤها في الولايات المتحدة من ديسمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن 9367 حالة وفاة لأشخاص حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). تُلزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مقدمي الرعاية الطبية بالإبلاغ عن جميع الوفيات بعد الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتى لو لم يكن اللقاح هو سبب الوفاة. لم تحدث أي وفيات بسبب أي أعراض جانبية، حتى النادرة منها، للقاحات فايزر أو موديرنا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

متى ينبغي لك الاتصال بطبيب طفلك؟

تختفي معظم الأعراض الجانبية في خلال يوم أو يومين. ولكن ينبغي لك الاتصال بأحد الأطباء في الحالات التالية:

- احمرار/الشعور بالألم في موضع حقن الطفل تزداد حدته بعد 24 ساعة
- شعور طفلك بأعراض غير معتادة أو مزيج من الأعراض الجانبية جراء الحصول على أكثر من لقاح في الوقت ذاته (من الأمان الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتزامن مع لقاحات أخرى).
- إذا ساورك القلق لعدم زوال الأعراض الجانبية لدى طفلك بعد بضعة أيام.



هل يمكن أن يحصل طفلي على لقاحات أخرى بالتزامن مع لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟

نعم! هذا وقت مناسب للتأكد من حصولك أنت وطفلك على أحدث جرعات اللقاحات الأخرى بالتزامن مع لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). سل طبيب طفلك عن الأعراض الجانبية لكل لقاح، بحيث تكون على علم بما ينبغي لك الانتباه له. من الممكن أن يعاني طفلك من أعراض جانبية للقاحين أو عدة لقاحات في الوقت ذاته.

هل ينبغي لي الإبلاغ عن أي أعراض جانبية يعاني منها طفلي بعد أن يحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية تعاني منها أنت أو طفلك بعد الحصول على اللقاح إلى نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية (VAERS) التابع لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). يمكنك أيضًا أن تطلب من طبيبك إبلاغ VAERS بالنيابة عنك. يساعد نظام الإبلاغ التابع لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها العلماء والخبراء الطبيين على الكشف سريعًا عن الأنماط غير المعتادة أو غير المتوقعة للمشكلات الصحية، التي قد تشير إلى وجود مشكلة في أمان اللقاح.

هل تسببت لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حدوث أي مشكلات تتعلق بالخصوبة؟

لا توجد أي بيانات تثبت أن اللقاحات تسبب العقم أو الإجهاض. توصي العديد من المؤسسات الطبية المرموقة السيدات الحوامل بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). فمن الأمان الحصول على اللقاح أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية. يزداد احتمال التعرض لمرض شديد أثناء الحمل، وينبغي للحامل استشارة طبيبها قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لا نعلم التأثير بعيد المدى.

يستمر ظهور الأعراض لدى العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال الذين سبقت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد إصابتهم بالعدوى لأول مرة. يُبلغ الأطفال عن الأعراض التي تؤثر على حياتهم اليومية لأسابيع بعد الإصابة، حتى لو لم يمرضوا بشدة أثناء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فقد يعاني الأطفال من التعب، والصداع، وآلام البطن، وآلام العضلات والمفاصل، وصعوبة في التذكر ومعالجة المعلومات.